

| No. | 癌症      | 指标  | 治疗计划                                   |
|-----|---------|---|--|
|     | 共通标准    | 可检测肿瘤 (最大12厘米)<br>无全身性转移<br>无胃肠道以及脊髓的侵袭<br>一般状态评分 0-2   |  |
| 1   | 骨与软组织肉瘤 | 组织学分型: 骨肉瘤, 脊索瘤, 软骨肉瘤, 未分化多形性肉瘤, 恶性周围神经鞘膜瘤, 平滑肌肉瘤, 滑膜肉瘤等<br>所在: 头颈部, 胸部, 脊髓/椎旁区域, 腹膜后区域, 骨盆<br>可检测肿瘤<br>在照射野中无金属植入物(比如接骨螺钉) | 4周内分割照射16次                             |
| 2   | 颅底肿瘤    | 脊索瘤, 软骨肉瘤等<br>手术后残留或复发, 以及手术不可的肿瘤   | 4周内分割照射16次                             |
| 3   | 胰腺癌     | 切除不可的肿瘤<br>无远端转移<br><br>无腹水<br>无胃肠道侵袭   | 3周内分割照射12次<br>根据病人病情推荐吉西他滨或者替吉奥联合治疗    |
| 4   | 肝癌      | 肝细胞癌<br><br>单一区域<br>肝功能分级A或B(C不可)<br>无腹水<br>肝动脉化疗栓塞术后的复发性肿瘤<br>胆管癌(肝脏内部)  | 1周内分割照射4次或者3周内分割照射12次(在边缘靠近胃肠道的情况下)    |
| 5   | 前列腺癌    | 临床分期:T1c-T3N0M0<br>格里森分数通过组织病理学检查被确认<br><br>在活组织检查前获得前列腺特异抗原值   | 3周内分割照射12次<br>根据我们的治疗方案推荐雄激素阻断治疗       |
| 6   | 肺癌      | 非小细胞肺癌<br><br>临床分期:I期-III期  | 1周内分割照射4次(临床I期)或者4周内分割照射16次(临床II-III期) |
| 7   | 直肠癌     | 外科手术后的复发性肿瘤<br>吻合术不合格导致的复发<br>盆壁或者淋巴结肿瘤<br>肿瘤与最近的胃肠道之间相距只有数毫米   | 4周内分割照射16次                             |
| 8   | 少数复发癌   | 位于淋巴结, 肝脏以及肺脏的复发性肿瘤   | 1周内分割照射4次或者3周内分割照射12次                  |