

No.	Kanser	Palatandaan	iskedyul
	Karaniwang Pamantayan	Sukat ng tumor (hanggang 12 cm) Tumor na hindi pa kumakalat sa ibang organ Hindi pa kumalat sa GI tract at spinal cord Performance status 0-2	
1	Sarcoma sa buto at soft tissue	Uring histological: Osteosarcoma, Chordoma, Chondrosarcoma, Undifferentiated Pleomorphic sarcoma, MPNST, Leiomyosarcoma, Synovial sarcoma, etc. Lugar: Ulo at leeg, thoracic region, spinal/paraspinal region, retroperitoneal region, pelvis Tumor na nasusukat Walang implant na bakal sa loob ng radiation field	16 na fractions sa loob ng 4 na linggo
2	Tumor sa ibaba ng bungo	Chordoma, Chondrosarcoma, etc. Tumor na pabalik-balik matapos ang operasyon o tumor na di maaring maoperahan	16 na fractions sa loob ng 4 na linggo
3	Kanser sa pancreas	Tumor na hindi maaaring maoperahan Tumor na hindi pa kumakalat sa ibang organ Walang pag-iipon ng tubig sa tiyan Hindi pa kumakalat sa GI tract	12 na fractions sa loob ng 3 na linggo Kasabay na GEM o S1 kung ipinahiwatig
4	Kanser sa atay	Hepatocellular carcinoma Sa isang bahagi lamang Child-Pugh A or B (not C) Walang pag-iipon ng tubig sa tiyan Pabalik-balik na tumor matapos ang TACE Cholangiocarcinoma (intra-liver)	4 na fractions sa loob ng 1 linggo o 12 na fractions sa loob ng 3 linggo (sakaling ang paligid ay malapit sa GI tract)
5	Kanser sa prostate	Clinical stage: T1c-T3N0M0 Kompirmasyon ng Gleason score sa pamamagitan ng histopathological na pagsusuri PSA value na nakuha bago ang biopsy	12 na fractions sa loob ng 3 linggo Ang Androgen deprivation therapy ay inirerekomenda ayon sa aming protokol
6	Kanser sa baga	Non-small cell lung cancer Clinical stage: Stage I - III	4 na fractions sa loob ng 1 linggo (Stage I) o 16 na fractions sa loob ng 4 na linggo (Stage II-III)
7	Rectal kanser	Pabalik-balik na tumor matapos ang operasyon Ang pagbalik ng anastomosis ay hindi karapat-dapat Tumor sa pelvic wall o sa lymph node Ang pagitan ng tumor at pinakamalapit na GI tract ay ilang milimetro lamang	16 na fractions sa loob ng 4 na linggo
8	Oligo recurrence	Pagbalik ng tumor sa ilang bahagi lamang gaya ng lymph node, atay at baga	4 na fractions sa loob ng 1 linggo o 12 na fractions sa loob ng 3 linggo